

2013

Planta del mes

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC

Escobón, escobón negro

Cytisus arboreus (Desf.) DC. subsp. *catalaunicus* (Webb) Maire



JARDÍN BOTÁNICO EL ALBARDINAL
 P. N. Cabo de Gata-Níjar, Rodalquilar, Almería



	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
HOJA												
FLOR												
FRUTO												

¿Dónde crece?

Se diferencia de la subsp. *baeticus* porque a diferencia de ésta, la subsp. *catalaunicus* presenta el fruto maduro glabro o glabrescente y el ovario enteramente glabro o viloso en 1 o 2 de sus márgenes.

Aunque durante la floración, se muestra densamente folioso, tras la misma pierde la mayoría de sus hojas.

Este escobón aparece incluido en la Lista Roja Andaluza en la categoría En Peligro, siendo sus amenazas principales los incendios y la presión ganadera.

¿Cómo es?

Se trata de un arbusto que excepcionalmente puede llegar a los 3 m de altura, con tallos densamente seríceos durante la elongación de los mismos, después glabrescentes, de sección redondeada, con 8 costillas longitudinales en forma de T. Las hojas son estipuladas, pecioladas y trifolioladas.

Su floración es muy llamativa, con grandes flores papilionadas de 13-22 mm, amarillas, pediceladas, solitarias o agrupadas en parejas, apareciendo en las axilas de las hojas del año anterior. Presentan 2-3 bractéolas en la mitad superior del pedicelo, rara vez cerca del cáliz. Cáliz 3,5-5,5 mm, campanulado, bilabiado y algo seríceo (cubierto de pelo fino, con aspecto sedoso). La corola es glabra, caduca y con la quilla obovada. Presenta 10 estambres, monadelfos (todos los estambres soldados por sus filamentos). El ovario es glabro, a veces ciliado en los márgenes, el estilo cilíndrico, enrollado después de la antesis, glabro con el estigma en forma de pincel. El fruto es una legumbre de 22-44 x 4-10 mm, aplanada, glabra o con algunos pelos marginales, que contiene de 3 a 9 semillas.

¿Dónde crece?

Vive en matorrales retamoides y claros de castaños, alcornoques o encinares, sobre esquistos, gneis, granitos o calizas de los 30 a los 1100 m, en ambientes termo o mesomediterráneos.

¿Dónde podemos encontrarla?

Esta subespecie habita en Andalucía (Málaga, Granada y Almería), Cataluña (Ampurdán y comarcas litorales de Barcelona) y SE de Francia y Marruecos (Rift y Atlas).



Andalucía, un jardín ¡ven a conocerlo!

El Albardinal - C/ Fundación s/n 04071 - Rodalquilar (Almería) - Tfno: 671 561 226 - jbotanico.albardinal.cma@juntadeandalucia.es

